




本PDF文件由

免费提供, 全部信息请点击[57414-02-5](#), 若要查询其它化学品请登录[CAS号查询网](#)如果您觉得本站对您的学习工作有帮助, 请与您的朋友一起分享:) [爱化学www.ichemistry.cn](#)

CAS Number:57414-02-5 基本信息

中文名:	亚硫酸氢钠甲萘醌; 甲萘醌合亚硫酸氢钠; 2-甲基-1,4-萘醌亚硫酸氢钠
英文名:	1-Naphthalenesulfonicacid, 1,4-dihydro-1-hydroxy-2(or 3)-methyl-4-oxo-, monosodium salt (9CI)
别名:	MENADIONE-SODIUM BISULFITE X H2O; MENADIONE SODIUM BISULFITE HYDRATE; menadione sodium bisulfite cell*culture tested; Menadionesodiumdisulfitetrihydrate; MENADION SODIUM BISULPHITE pure

分子结构:



D1 - Me

Na

分子式: $C_{11}H_{10}O_5S \cdot Na$

分子量: 286.32

CAS登录号: 57414-02-5

物理化学性质

性质描述:	亚硫酸氢钠甲萘醌 (57414-02-5) 的性状: 白色结晶。 1g产品溶于约2ml水, 微溶于乙醇, 几乎不溶于乙醚和苯。
-------	---

CAS#57414-02-5化学试剂供应商(点击生产商链接可查看价格)

供应商信息已更新, 请登录爱化学 [CAS No. 57414-02-5](#) 查看

若您在此化学品供应商, 请按照[化工产品收录](#)说明进行免费添加

其他信息

产品应用:	亚硫酸氢钠甲萘醌 (57414-02-5) 的用途: 用于有机合成。
-------	---------------------------------------

亚硫酸氢钠甲萘醌 (57414-02-5) 的贮存:

本品应密封保存。

生产方法及其他:	适应症: ①止血: 用于阻塞型黄疸、胆痿、慢性腹泻、广泛肠切除所致吸收功能不良患者, 早产儿、新生儿低凝血酶原血症, 香豆素类或水杨酸类过量以及其他原因所致凝血酶原过低等引起的出血。亦可用于预防长期口服抗生素类药物引起的维生素K缺乏病。 ②镇痛: 用于胆石症、胆道蛔虫症引起的胆绞痛。 ③解救杀鼠药“敌鼠钠”中毒: 宜用大剂量。 用法用量: (1)止血: ①肌注, 肌注每次2~4mg, 每日4~8mg。防止新生儿出血可在产前1周给孕妇肌注, 每日2~4mg。②口服: 每次2~4mg, 每日6~20mg。 (2)胆绞痛: 肌注, 每次8~6mg。 用药须知: ①较大剂量可致新生儿、早产儿溶血性贫血和高胆红素血症及黄疸。在红细胞6-磷酸脱氢酶缺乏症患者可诱发急性溶血症贫血。 ②可致肝损害。肝功能不全者可改用维生素K₁。肝硬化或晚期肝病患者出血使用本品无效。 剂型规格: (1)注射剂: 1ml: 4mg, 1ml: 2ml。 (2)片剂: 2mg/片。
相关化学品信息	
乙酸镉二水合物 聚六亚甲基胍盐酸盐 4-丁基-5-甲基噻唑 571-51-7 硬脂酸 咪唑-4, 5-二羧酸 1, 2-二溴-1, 2-联苯乙烷 577971-19-8 1-苄基吡咯烷-3-甲酸 579-45-3 异氰酸聚亚甲基聚亚苯基酯与[(1-甲基-1, 2-亚乙基)双(氧基)]双[丙醇]的聚合物 1-萘酚-3, 6-二磺酸 β-羟基苯丙酸乙酯 三苯基铈六氟磷酸酯 利福定 丙醚 乙酰丙酮铈 苯基丙酮	